

Департамент по экономическим и социальным вопросам
Отдел народонаселения

ВИЧ/СПИД: осведомленность и поведение

Резюме



Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2002 год

ВИЧ/СПИД: осведомленность и поведение

Резюме

Хотя прошло 20 лет с начала пандемии вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), исследования социальных и поведенческих аспектов ВИЧ/СПИД по-прежнему носят ограниченный характер. Сведения, касающиеся сексуального поведения, знаний о СПИД и отношения к нему, являются разрозненными и с трудом поддаются сопоставлению. Настоящая публикация, подготовленная Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, опирается прежде всего на уникальный источник информации, позволяющий документально отражать уровень осведомленности о СПИД и связанном со СПИД поведении, а именно на результаты демографических обследований и обследований здоровья населения (ДЗН). Эти обследования содержат колоссальное количество информации по ВИЧ/СПИД, которая до настоящего времени не распространялась среди широкой общественности.

В этой публикации, которая выпускается по случаю первой годовщины специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (25–27 июня 2001 года), изложены результаты целого ряда национальных демографических обследований и обследований здоровья населения, которые напрямую связаны с эпидемией СПИД. Публикация дает представление об уровне осведомленности о ВИЧ и СПИД и о соответствующем поведении в разных странах и среди различных групп населения с разбивкой по возрасту и полу. Информация о небезопасном поведении, об определяющих его факторах и о том контексте, в котором оно имеет место, может быть непосредственно использована для целевого планирования усилий по предупреждению СПИД.

Согласно данным, полученным из 39 стран Африки, Азии и Латинской Америки:

- уровень осведомленности о СПИД относительно высок. Более чем в половине стран по крайней мере 90 процентов женского населения слышало о СПИД и более чем в трех четвертях стран об этом заболевании известно по меньшей мере 90 процентам мужского населения. Однако в отдельных странах уровень осведомленности по-прежнему низок. В Бангладеш и Непале о СПИД знает менее одной трети замужних и состоявших ранее в браке женщин;
- в большинстве стран мужчины лучше осведомлены о СПИД, чем женщины. Такая разница в показателях для мужчин и женщин достигает 34 процентных пунктов в Нигере и 28 процентных пунктов в Чаде. Расхождение в уровне осведомленности о СПИД среди мужчин и женщин также значительно в Бангладеш (19 процентных пунктов), Бенине (13 процентных пунктов), Эритрее (17 процентных пунктов), Мали (19 процентных пунктов), Мозамбике (12 процентных пунктов) и Нигерии (15 процентных пунктов);
- уровень осведомленности зависит от распространенности ВИЧ/СПИД. В 12 странах, в которых показатель инфицирования ВИЧ превышает

5 процентов, уровень осведомленности населения достигает по меньшей мере 90 процентов, в то время как в двух странах, в которых показатель инфицирования составляет менее 1 процента, о СПИД знает менее половины участвовавших в опросах женщин;

- городские жители гораздо лучше осведомлены о СПИД, чем сельские жители. Во всех странах, за исключением трех, уровень осведомленности об этом заболевании среди женщин, проживающих в городских районах, достигает 93 процентов. Различия между показателями осведомленности среди сельского и городского населения колоссальны в нескольких странах, включая Бангладеш, Боливию, Гватемалу, Индонезию, Непал, Перу, Чад и Эритрею;
- чем выше уровень образования населения, тем более оно осведомлено о СПИД и тем более глубокими знаниями в этой области оно обладает. В большинстве стран практически все респонденты с уровнем образования не ниже среднего слышали о СПИД. В 31 из 34 стран, по которым имеются данные, по меньшей мере 95 процентов респондентов-женщин, имеющих самый высокий уровень образования, знало о СПИД;
- в некоторых странах различия между уровнем информированности более образованных и менее образованных респондентов являются весьма значительными. Так, в Индонезии 88 процентов наиболее образованной группы населения осведомлено о СПИД, по сравнению с 14 процентами по группе респондентов, не имеющих образования;
- однако в тех случаях, когда общенациональный показатель осведомленности весьма высок, даже лица без образования знают о СПИД. В 14 странах, для которых характерен высокий уровень осведомленности, 90 или более процентов не имеющих образования респондентов слышало о СПИД. В Бразилии, Замбии, Малави и Уганде целых 98 процентов респондентов без образования заявило о том, что они знают о СПИД;
- чаще всего упоминаемым источником сведений о СПИД является радио. Примерно половина респондентов-женщин и более 70 процентов респондентов-мужчин услышали о СПИД по радио. Так же весьма примечателен тот факт, что во многих странах мужчины значительно чаще, чем женщины, узнали о СПИД по радио;
- после радио одним из наиболее важных источников информации о СПИД во многих странах являются друзья и родственники. По меньшей мере 50 процентов респондентов-женщин в 10 странах Африки заявляют о том, что они услышали о СПИД от друзей или родственников;
- в настоящее время школы и учителя, как представляется, играют незначительную роль в повышении уровня осведомленности о СПИД. Во многих странах, в особенности в странах с низким уровнем осведомленности о СПИД, школы и учителя в качестве источников информации о СПИД были упомянуты менее чем 10 процентами респондентов;
- среди тех, кто слышал об этом заболевании, значительное большинство респондентов-женщин знает, что практически все болеющие им люди

умирают. Однако в некоторых странах значительное меньшинство так не считает. В Иордании, Колумбии и Мозамбике примерно четверть респондентов считает, что заболевание СПИД почти никогда не ведет к смерти или же это происходит весьма редко;

- во многих охваченных обследованиями странах большинство респондентов-женщин, знающих о СПИД, осведомлено о том, что здоровый на вид человек может быть болен СПИД и что могут пройти годы, прежде чем у инфицированного лица могут проявиться признаки болезни;
- хотя по миру в целом по меньшей мере три четверти респондентов информировано о том, что СПИД передается от матери к ребенку, в некоторых странах многие женщины, знающие, что они инфицированы ВИЧ, все-таки хотят забеременеть;
- практически во всех обследованных странах, включая страны с высоким показателем распространенности ВИЧ, по меньшей мере две трети респондентов-женщин и 80 процентов респондентов-мужчин заявили о том, что они совершенно не рискуют заболеть СПИД или же такой риск весьма мал. Ни в одной из обследованных стран уровень образования респондентов не играет существенной роли в том, что касается ответов на этот вопрос;
- женщины, пожалуй, в несколько большей степени сознают связанные со СПИД угрозы, чем мужчины. Участвовавшие в обследованиях респонденты-мужчины, как правило, чаще, чем женщины верят в то, что им практически не угрожает риск инфицирования ВИЧ/СПИД, и лишь небольшое количество пар одинаково относится к этим опасностям;
- во всех странах большинство респондентов, слышавших о СПИД, знают по крайней мере один из способов недопущения передачи этого заболевания половым путем. Тем не менее в половине охваченных обследованиями стран, включая некоторые страны, в которых более 5 процентов взрослого населения инфицировано ВИЧ/СПИД, от одной четверти до одной трети респондентов-женщин не знает о каких-либо способах избежать заражения СПИД;
- по крайней мере 80 процентов — а нередко и 90 процентов — мужчин знают по меньшей мере об одном виде венерических заболеваний. По группе женщин аналогичный показатель знаний зафиксирован в отдельных странах: Бразилия, Замбия, Зимбабве, Кения и Уганда. Однако в других странах примерно половина респондентов-женщин не знает, что они могут заразиться в результате половой связи;
- те респонденты, которым известно, что ВИЧ передается половым путем, в качестве двух способов избежать инфицирования чаще всего указывают на использование презервативов и наличие лишь одного партнера для сексуальной связи;
- во всех охваченных обследованиями странах значительное большинство мужчин — от 60 до 90 процентов — сообщило о том, что они изменили свое поведение, с тем чтобы избежать СПИД. В отличие от этого лишь в