



# Generalversammlung

Verteilung: Allgemein  
27. September 2002  
Deutsch  
Original: Englisch

---

Siebenundfünfzigste Tagung

Tagesordnungspunkt 44

Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-Gipfels

## Umsetzung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen

### Bericht des Generalsekretärs

#### Korrigendum

1. Ziffer 41

Der zweite Satz *soll lauten*:

In Ostasien konnte der Anteil der **Hunger** leidenden Menschen mit Erfolg gesenkt werden, wohingegen der Anteil der mangelernährten Menschen in Afrika weitgehend gleich geblieben ist.

2. Ziffer 111

Der letzte Satz *soll lauten*:

Darum beabsichtige ich, der Generalversammlung im September 2002 einen Bericht vorzulegen, der Vorschläge für weitere programmatische, institutionelle und verfahrensmäßige Verbesserungen enthält, damit wir die ehrgeizigen Vorgaben der Erklärung in einen realistischen Aktionsplan übertragen können.

3. Anhang, Tabelle, Ziel 6

Der Wortlaut von Ziel 6 soll durch folgenden Wortlaut ersetzt werden:

Ziele und Zielvorgaben	Indikatoren	1990	2000 <sup>a,b</sup>	Maßeinheit
<b>Ziel 6. Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten</b>				
<b>Zielvorgabe 7.</b> Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/Aids zum Stillstand bringen und allmählich umkehren	18. HIV-Prävalenz bei schwangeren Frauen (15- bis 24-Jährige)	n.v.	n.v.	
	Geschätzte HIV-Prävalenz bei jungen Menschen (15- bis 24-Jährige)			(Erste verfügbare weltweite Zahlen: 1999, letzte verfügbare weltweite Zahlen: 2001.)
	Welt	1,2 0,7 1,0	1,4 0,8 1,1	Prozent insgesamt Prozent Männer Prozent Frauen  (Für Einzelregionen lagen nur Zahlen für 1999 vor.)
	Entwickelte Regionen	n.v.	0,2	Prozent insgesamt
	Europa	n.v.	0,2	Prozent insgesamt
	Entwicklungsregionen	n.v.	1,1	Prozent insgesamt
	Afrika	n.v.	5,1	Prozent insgesamt
	Nordafrika	n.v.	0,02	Prozent insgesamt
	Afrika südlich der Sahara	n.v.	6,3	Prozent insgesamt
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	0,5	Prozent insgesamt
	Asien	n.v.	0,2	Prozent insgesamt
	Ostasien	n.v.	0,1	Prozent insgesamt
	Südliches Zentralasien	n.v.	0,3	Prozent insgesamt
	Südostasien	n.v.	0,4	Prozent insgesamt
	Westasien	n.v.	0,01	Prozent insgesamt
	Ozeanische Länder	n.v.	0,2	Prozent insgesamt
	19. Anteil der Kondombenutzung innerhalb der kontrazeptiven Prävalenzrate <sup>h</sup>			Prozent
	Welt	n.v.	7	
	Kontrazeptive Prävalenzrate			
	Welt	57	67	
	20. Zahl der wegen HIV/Aids verwaisten Kinder <sup>i</sup>			Millionen (Letzte verfügbare Zahlen: 2001.)
	Alle drei Regionen (88 Länder)	0,9	13,4	
	Afrika	0,8	11,0	
	Asien	0,007	1,8	
	Lateinamerika und Karibik	0,054	0,6	

<i>Ziele und Zielvorgaben</i>	<i>Indikatoren</i>	<i>1990</i>	<i>2000<sup>a,b</sup></i>	<i>Maßeinheit</i>	
<b>Zielvorgabe 8.</b> Bis 2015 die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten zum Stillstand bringen und allmählich umkehren	21. Malariaprävalenz und Sterblichkeitsraten im Zusammenhang mit Malaria				
	Weltweite Prävalenzrate	n.v.	n.v.		
	Weltweite Sterblichkeitsrate	n.v.	148	Todesfälle je 100.000 Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren.	
	Entwickelte Länder	n.v.	0		
	Entwicklungsländer	n.v.	166		
	Afrika				
	Nordafrika	n.v.	47		
	Afrika südlich der Sahara	n.v.	791		
	Asien				
	Ostasien		0		
	Südliches Zentralasien	n.v.	6		
	Südostasien	n.v.	2		
	Westasien	n.v.	26		
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	1		
	Ozeanische Länder	n.v.	2		
	22. Anteil der Bevölkerung in malariagefährdeten Gebieten, der wirksame Malariaverhütungs- und -bekämpfungsmaßnahmen ergreift <sup>1</sup>				Prozent
	Welt	n.v.	n.v.	(Für Prävention und Behandlung liegen keine weltweiten Zahlen vor.)	
	21 afrikanische Länder	n.v.	<5	(Prävention)	
	14 afrikanische Länder	n.v.	50	(Behandlung von Kindern mit Fieber)	
	23. Tuberkuloseprävalenz und Sterblichkeitsraten im Zusammenhang mit Tuberkulose				
	Weltweite Prävalenzrate	n.v.	123	Prävalenz je 100.000 Menschen	
	Entwickelte Länder	n.v.	24		
	Entwicklungsländer	n.v.	147		
Afrika	n.v.	187			
Nordafrika	n.v.	27			
Afrika südlich der Sahara	n.v.	223			
Asien	n.v.	153			
Ostasien	n.v.	88			
Südliches Zentralasien	n.v.	196			
Südostasien	n.v.	239			

<i>Ziele und Zielvorgaben</i>	<i>Indikatoren</i>	<i>1990</i>	<i>2000<sup>a,b</sup></i>	<i>Maßeinheit</i>
	Westasien	n.v.	42	
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	44	
	Ozeanische Länder	n.v.	217	
	Weltweite Sterblichkeitsrate	n.v.	28	Todesfälle je 100.000 Menschen
	Entwickelte Länder	n.v.	5	
	Entwicklungsländer	n.v.	33	
	Afrika			
	Nordafrika	n.v.	5	
	Afrika südlich der Sahara	n.v.	62	
	Asien			
	Ostasien	n.v.	19	
	Südliches Zentralasien	n.v.	40	
	Südostasien	n.v.	49	
	Westasien	n.v.	11	
	Lateinamerika und Karibik	n.v.	11	
	Ozeanische Länder	n.v.	44	
	24. Anteil der diagnostizierten und mit Hilfe der ambulanten Kurzzeittherapie DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) geheilten Tuberkulosefälle	11	27	Prozent diagnostiziert (Erste verfügbare Zahlen: 1995.)
		77	80	Prozent geheilt (Erste verfügbare Zahlen: 1995.)

**4. Anhang, Tabelle, Ziel 7**

Anmerkung k *soll lauten*: Weltweite Zahlen.